

Ficha Técnica de Produto: UNIBROT

Referência: FC0282A

TEORES DECLARADOS

Aminoácidos livres	2,8% p/v	2,0% p/p
Azoto (N) total	10,6% p/v	7,6% p/p
Azoto (N) orgânico	0,4% p/v	0,3% p/p

Outros teores:

Óxido de cálcio (CaO) solúvel em água	17,8% p/v	12,7% p/p
---------------------------------------	-----------	-----------

CLASSIFICAÇÃO

7.2. Adubos com aminoácidos.

Classe A - Teor de metais pesados inferior aos limites admissíveis para esta classificação (RD 506/2013 como norma de aplicação do Regulamento (CE) N.º 2003/2003).

PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Formulação	Solução
Cor	Castanha
Densidade a 20°C	1,47 ± 0,01 kg/l
pH	3,0 ± 0,5
Solubilidade em água	Totalmente solúvel

PROPRIEDADES

O Unibrot é um bioestimulante com aminoácidos enzimáticos de origem vegetal associados a cálcio de fácil assimilação.

O Unibrot uniformiza o desenvolvimento fenológico dos botões vegetativos e reprodutivos que podem estar atrasados devido a factores nutricionais da planta, reduz o número de botões cegos e aumenta a fertilidade e a percentagem de botões abertos.

O Unibrot permite concentrar o abrolhamento, o que origina um crescimento mais uniforme e concentrado dos frutos e aumenta a colheita.

Versão 1 de 14/09/2021

SEDE OLHÃO
morada Parque Hubel, Pechão,
8700-179 Olhão
tel 289 710 515 fax 289 710 516

ALPIARÇA
morada Zona Industrial, lotes 55 e
56, 2090-242 Alpiarça
tel 243 557 606 fax 243 557 607

FERREIRA DO ALENTEJO
morada Parque Empresas, 16 e 30
7900-571 Ferreira do Alentejo
tel 284 739 612

hv@hubel.pt
www.hubelverde.com



DOSAGENS E MODO DE UTILIZAÇÃO

O Unibrot é recomendado para aplicação na madeira antes do abrolhamento em colheitas com necessidades de horas de frio, como árvores de fruto de folha caduca (cereja, nectarina, pêssego, damasco) e uva de mesa.

Recomenda-se molhar bem todas as partes da planta.

Dose recomendada:

Cultura	Via	Dose
Cereja, pêssego, nectarina, damasco, paraguaio, uva de mesa	Foliar, na madeira sem abrolhamento	5 a 8% 1 aplicação por ciclo cultural Desde 45 DAF/B* até 15 DAF/B* ou com 10% dos botões na fase de botão inchado. Aplicar entre BBCH 51 e 55

Volume de calda: 500 - 800 l/ha

*DAF/B: *Dias Antes da Floração / Abrolhamento*

OBSERVAÇÕES

O Unibrot não está sujeito a qualquer consideração toxicológica tanto no transporte como no armazenamento. O produto é compatível com a maioria dos produtos químicos utilizados na agricultura. No entanto, é sempre recomendado realizar um teste prévio de compatibilidade.

Aplicar sob assessoria técnica agronómica.

O produto mantém-se estável em condições normais de armazenamento por um período mínimo de 36 meses.

Armazenar em local fresco e seco.

Temperatura de armazenamento óptima: entre 5 e 30°C.

Não empilhar mais de três vasilhas ou cinco caixas de altura.

Ler atentamente a etiqueta antes de usar.

P102 Manter fora do alcance das crianças.

P270 Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.